




**Vincent
Brouillette**
orthésiste

Une lésion au ligament croisé antérieur (LCA) est la conséquence d'une violente torsion, d'un impact ou encore d'une hyper-extension exercée au genou. Plusieurs sports de contact y sont associés tels que le football et le ski. Ce ligament assure la stabilité rotatoire du genou ainsi, une déchirure de celui-ci qui serait non traitée pourrait provoquer un cisaillement. Une usure progressive (gonarthrose) sera alors observée et même une nouvelle blessure pourrait s'en suivre. L'orthopédiste vous conseillera le meilleur traitement possible, chirurgical ou non. Le port de l'orthèse est recommandé lors d'une déchirure partielle ou après une chirurgie du LCA. L'orthésiste, de son côté, vous guidera alors vers le



meilleur appareil possible selon vos besoins. L'orthèse vous permettra d'avoir une réadaptation sécuritaire et une reprise des activités sportives par la suite. L'instabilité et la torsion seront contrôlées par le moulage, les articulations et les différents principes biomécaniques de l'orthèse.

Villeneuve
laboratoire orthopédique

www.laboratoirevilleneuve.com

123, boul. Industriel (coin Masson)
Repentigny (AUTOROUTE 40 - SORTIE 100)

(450) **581-0140**

PERMIS MSSS 2103-631-4